Le transfert des PCBs du sédiment au biote dans le Rhône

Christelle Lopes
Cemagref de Lyon
Laboratoire d'Ecotoxicologie

<https://tsip-pcb.cemagref.fr/>

Équipes du projet

M. Desmet*, G. Roux – ENTPE L.S.E. (* actuellement Université de Tours)
M. Babut, C. Miège, M-C. Roger, A. Roy, C. Lopes, B. Motte - CEMAGREF
H. Persat – CNRS, LEHF UMR 5023, Université Lyon 1
P. Bonté, I. Schmitt – CNRS-CEA LSCE, Gif sur Yvette
B. Mahler, P. Van Metre - USGS, Austin

ZABR

ZONE ATELIER BASSIN DU RHONE
RHONE BASIN LONG TERM ENVIRONMENTAL RESEARCH

Séminaire TSIP, 06 janvier 2011

Transfert trophique

PCB ?

Voies de contamination et d'élimination des PCBs

Modèle de bioaccumulation

➤ Principes: modèle cinétique à base physiologique, décrivant la cinétique de contamination d'un poisson en congénère c

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ov})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ov})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ov}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ov})$

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

↪ Inférence Bayésienne pour estimer les paramètres impliqués dans chaque fonction

Hypothèses sous-jacentes

- Distribution homogène du congénère à l'intérieur de l'organisme, vraisemblable à long terme pour congénères faiblement métabolisés
- Organisme décrit comme un compartiment unique en interaction avec son environnement

Choix du congénère étudié

- PCB comptant 5 à 7 atomes de chlore sont les plus susceptibles de se bioaccumuler dans la chaîne trophique

↪ Congénère 153 avec 6 atomes de chlore = bon candidat

Distribution des PCBi (Poissons)

Choix du congénère étudié

- PCB comptant 5 à 7 atomes de chlore sont les plus susceptibles de se bioaccumuler dans la chaîne trophique
- #153 corrélé à $\sum PCB_i$ → bon indicateur

$$\#153 = -11.9 + 0.48 * \sum PCB_i$$

- $\log(K_{ow})$ pour #153 varie de 6.58 à 8.31 (Lie *et al.*, 2003), valeur moyenne souvent employée = 6.92

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, Lf(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Variation annuelle de la température de l'eau

- Données de températures depuis 20 ans entre MTE et GDL
→ données de 1994 à 2008 retenues car le plus vieux poisson a 14 ans
- Ajustement d'un modèle « gaussien » :

$$T = \delta + \alpha * \exp\left(-0.5 * \frac{(t - \beta)^2}{\sigma^2}\right)$$

- Température moyenne
- - Intervalle de crédibilité des prédictions à 95%
- - Intervalle de crédibilité des prédictions à 99%

↻ Température estimée chaque jour par tirages aléatoires dans l'intervalle de crédibilité

Températures moyennes de 1994 à 2008

Température de l'eau

➤ Modèle gaussien ajusté sur 3 périodes de 5 ans

Températures moyennes de 1994 à 1998

Températures moyennes de 1999 à 2003

Températures moyennes de 2004 à 2008

- Température moyenne
- - Intervalle de crédibilité des prédictions à 95%
- - Intervalle de crédibilité des prédictions à 99%

↪ Pas de décalage temporel donc ajustement sur données globales utilisé

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, Lf(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Relation Taille/Poids

$$\log(W(t)) = a * \log(L(t)) - b \Leftrightarrow W(t) = L(t)^a * 10^{-b}$$

Relation Taille/Âge : Von Bertalanffy

$$\frac{dL(t)}{dt} = k (L_{\infty} - L) \Leftrightarrow L(t) = L_{\infty} - (L_{\infty} - L(0)) \exp(-k t)$$

o MTE
o GDL
o BRE

— Ajustement moyen
- - Intervalle de crédibilité
des prédictions à 95%

Relation Poids/Age

$$W(t) = L(t)^a * 10^{-b} = (L_{\infty} - (L_{\infty} - L(0)) \exp(-k t))^a * 10^{-b}$$

o MTE
o GDL
o BRE

— Ajustement moyen
- - Intervalle de crédibilité
des prédictions à 95%

Rétro-calcul de l'âge

$$Age = -\frac{1}{k} * \ln\left(1 - \frac{L}{L_{\infty}}\right) + \frac{1}{k} * \ln\left(1 - \frac{L_0}{L_{\infty}}\right) = \frac{1}{k} * \ln\left(\frac{L_{\infty} - L_0}{L_{\infty} - L}\right)$$

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Taux de filtration de l'eau (L/g/j)

- Gobas (1993); Gobas et Wilcockson (2003) :

$$U_{c,i}(t) = \frac{K_{ow_c} * 0.01 * 88.3 * (W_i(t)/1000)^{0.6}}{K_{ow_c} * 0.01 + 1}$$

- Gobas (2004); Gobas et Arnot (2010) :

$$U_{c,i}(t) = \frac{1400 * (W_i(t)/1000)^{0.65}}{C_{ox}(t)}$$

$C_{ox}(t)$: concentration en oxygène dans l'eau à t

$$C_{ox}(t) = \begin{cases} 14.45 - 0.413 * T(t) + 0.0056 * T(t)^2 & \text{Norstrom et al. (1976)} \\ (-0.24 * T(t) + 14.04) * S & \text{Arnot et Gobas (2004)} \end{cases}$$

- Gewurtz et al. (2006) : $U_{c,i}(t) = \frac{24 * M_i(t)}{E_{ox} C_{ox}(t)}$ $M_i(t)$: métabolisme énergétique nécessaire pour une activité normale

$$\log(M_i(t)) = 0.67 * \log(W_i(t)) + 0.017 * T(t) - 0.77$$

Taux de filtration de l'eau (L/g/j)

Barbeau

Brème

Chevaine

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Efficacité d'assimilation *via* l'eau : α_c

➤ Thomann et al. (1992) :

$$\log(\alpha_c) = \begin{cases} \log(0.8) & \text{si } \log(K_{ow}) < 6 \\ 2.9 - 0.5 * \log(K_{ow}) & \text{sinon} \end{cases}$$

Efficacité d'assimilation *via* l'eau : α_c

➤ Thomann et al. (1992) :

$$\log(\alpha_c) = \begin{cases} \log(0.8) & \text{si } \log(K_{ow}) < 6 \\ 2.9 - 0.5 * \log(K_{ow}) & \text{sinon} \end{cases}$$

➤ Arnot et Gobas (2004) : $\alpha_c = \left(1.85 + \frac{155}{K_{ow}(25^\circ C)} \right)^{-1} \approx 0.54 \quad \forall K_{ow}$

Modèle de bioaccumulation

Poissons:

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Fraction lipidique

Taux d'élimination par les branchies (j^{-1})

➤ Gobas (1993) :
$$H_{c,i}(t) = \frac{\alpha_c U_{c,i}(t)}{L_{f_i}(t) * Kow_c}$$

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Efficacité d'assimilation *via* l'alimentation : β_c

➤ Thomann et al. (1992) :

$$\log(\beta_c) = \begin{cases} \log(\mathbf{0.8}) & \text{si } \log(K_{ow}) < \mathbf{6.5} \\ \mathbf{4.84 - 0.731 * \log(K_{ow})} & \text{sinon} \end{cases}$$

Efficacité d'assimilation *via* l'alimentation : β_c

➤ Thomann et al. (1992) :

$$\log(\beta_c) = \begin{cases} \log(\mathbf{0.8}) & \text{si } \log(K_{ow}) < \mathbf{6.5} \\ \mathbf{4.84 - 0.731 * \log(K_{ow})} & \text{sinon} \end{cases}$$

➤ Arnot et Gobas (2004) : $\beta_c = (3.10^{-7} * K_{ow}(25^{\circ}C) + 2)^{-1}$

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Taux d'ingestion des proies (j^{-1})

- Ramos et al. (1982)

$$F_i(t) = 5.83 * 10^{-2} * W_i(t) * \exp(0.04 * T(t) - 2.17)$$

- Gobas (2003) :

$$F_i(t) = 0.022 * W_i(t)^{0.85} * \exp(0.06 * T(t))$$

Taux d'ingestion des proies (j^{-1})

Barbeau

Brème

Chevaine

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_{c,i}(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Préférences alimentaires

➤ Analyses des contenus stomacaux

1- Diptères; 2- Autres Insectes aquatiques; 3- Crustacés; 4- Gastéropodes; 5- Bivalves; 6- Macrophytes; 7- Autres (algues, annélides...)

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_i(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Taux d'excrétion (j^{-1})

➤ Ballestrazzi et Lanari (1996) : $\ln(E(t)) = -1.92 + 0.221 * \ln(W(t))$

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \underbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie respiratoire}} + \underbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}_{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + \boxed{G_i(t)} + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_i(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Taux de croissance journalier

$$g(t) = \ln\left(\frac{W(t+1)}{W(t)}\right) \Rightarrow G(t) = \exp(g(t)) - 1$$

Chevaine

Barbeau

Breme

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\begin{aligned}
 \frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = & \overbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}^{\text{Voie respiratoire}} + \overbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}^{\text{Voie trophique}} \\
 & - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + \cancel{M_{c,i}(t)})}_{\text{Voie métabolique}} C_{c,i}(t) - \underbrace{\cancel{R_i(t)}}_{\text{Voie reproductive}} C_{c,i}(t)
 \end{aligned}$$

$U_i(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Modèle de bioaccumulation

Poissons :

$$\frac{dC_{c,i}(t)}{dt} = \overbrace{U_{c,i}(t) \alpha_c C_{c,w}(t) - H_{c,i}(t) C_{c,i}(t)}^{\text{Voie respiratoire}} + \overbrace{\beta_c F_i(t) \sum_j Q_{i,j} C_{c,j}(t)}^{\text{Voie trophique}} - \underbrace{(E_i(t) + G_i(t) + M_{c,i}(t)) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie métabolique}} - \underbrace{R_i(t) C_{c,i}(t)}_{\text{Voie reproductive}}$$

$U_i(t)$: Taux de filtration de l'eau $\rightarrow U(W(t), T(t), K_{ow})$

α_c : Efficacité d'assimilation des particules dissoutes en congénère $c \rightarrow \alpha(K_{ow})$

$H_{c,i}(t)$: Taux d'élimination par les branchies $\rightarrow H(W(t), T(t), K_{ow}, L_f(t))$

β_c : Efficacité d'assimilation des particules ingérées $\rightarrow \beta(K_{ow})$

$Q_{i,j}$: Préférence alimentaire de l'espèce i envers la proie j (contenus stomacaux)

$F_i(t)$: Taux d'ingestion $\rightarrow F(W(t), T(t))$

$E_i(t)$: Taux d'excrétion $\rightarrow E(W(t))$

$G_i(t)$: Taux de croissance $\rightarrow G(W(t))$

$M_i(t)$: Taux de métabolisation

$R_i(t)$: Taux de reproduction

Concentration dans l'eau : $C_{c,w}(t)$

- Supposée constante au cours du temps
- Valeur utilisée provenant des valeurs discutées dans le rapport de l'usine TREDI en juillet 2010 (différentes sources)
 - ↪ Mesures réalisées systématiquement inférieures à la limite de quantification
 - ↪ Valeur moyenne dans le Haut-Rhône : $\sum PCB_i = 0.2 \text{ ng/L}$

Concentration dans les proies

- Concentrations constantes : celles mesurées lors de notre campagne
- Modèle cinétique :

Invertébrés :

$$\frac{dC_{j,c}(t)}{dt} = \underbrace{\varepsilon_{j,s}}_{\text{Voie trophique}} C_s(t)$$

Isotopes

$\varepsilon_{j,s}$: contribution du carbone d'origine sédimentaire

↻ $\varepsilon_{j,s}(t)$?

Méthode de simulation

- Modèle implémenté dans (code disponible et facilement réutilisable)
- 10000 tirages aléatoires dans $W(t)$ et $T(t)$ → estimation de $U(t)$, $H(t)$, $F(t)$, $E(t)$ et $G(t)$ et intervalle de crédibilité
→ moyenne et intervalle de crédibilité autour de $C_c(t)$
- Concentration constante chez invertébrés (MTE/GDL-BRE) :
 - Chironomes : 1 / 30 ng/g PF
 - Gammarés : 8 / 15 ng/g PF
 - Ephémères : 6 / 15 ng/g PF
 - Bivalves : 0.4 / 7 ng/g PF
- $C_c(0) = 0$: poissons non contaminés à la naissance
- $\log(K_{ow}) = 6.92$

Résultats Amont

Barbeau Amont

Breme Amont

Chevaine

Comparaison Prédictions / Observations

Résultats Grand Large

Barbeau GDL

Brème GDL

Chevaine GDL

Comparaison Prédictions / Observations

Résultats Aval

Barbeau Aval

Brème Aval

Chevaine Aval

Comparaison Prédictions / Observations

Comparaison Prédiction / Observations

○ Chevaïne
Barbeau

■ Brème

▲

Contributions relatives voies respiratoire / trophique

Barbeau

Brème

Chevaine

Conclusions - Perspectives

➤ « Amélioration » du modèle

- Étude du taux d'excrétion
- Tester la sensibilité du modèle aux différents paramètres
- Modèle de cinétique de contamination des invertébrés
- Inclure d'autres compartiments (phytoplancton et/ou macrophytes) ?
- Tester d'autres congénères (PCBi)
- Valider le modèle sur d'autres données disponibles

➤ Utilisation du modèle

- Prédictif : définir une concentration dans les sédiments compatible avec la norme sanitaire
- Rétrospectif : comparer les niveaux de contaminations passés aux présents

Barbeau

Barbeau

Merci

Brème

Chevaîne